


배추
생육 실측결과

농업관측본부 aglook.krei.re.kr

6월 상순 고랭지배추 생육 실측결과, 초기 작황 양호



강원

전년과 비슷

4월 정식지역

전년과 비슷

평창(방림, 봉평), 횡성

5월 정식지역

전년과 비슷

삼척, 정선, 홍천, 횡성, 평창(대관령, 진부)



강원지역 최근 1개월 기상여건 평년 대비 양호

평균기온



높음




평년보다 높은 18.6℃

누적강수량



적음



평년보다 적은 41.4mm

일조시간



많음



평년보다 많은 62시간

2020년 고랭지배추 생육실측 1차 조사결과(6.8.~6.12.)

□ 2020년 고랭지배추 생육상황 전년과 비슷하며, 최근 기상 여건 양호

• 고랭지배추 초장, 엽폭 실측 결과, 전년과 비슷한 것으로 조사

- 준고랭지1기작 배추(4월 정식) 초장 27.3cm, 엽폭 21.7cm로 전년과 비슷
- 고랭지배추(5월 정식) 초장 25.7cm, 엽폭 19.7cm로 전년과 비슷

<2020년 고랭지배추 생육 실측 조사 결과>

구분		초장(cm)		엽폭(cm)	
		금년	전년	금년	전년
준고랭지1기작	4월 정식 (6~7월 출하)	27.3	28.2	21.7	20.6
고랭지	5월 정식 (7~8월 출하)	25.7	26.1	19.7	19.0

자료: KREI 농업관측본부 산지기동팀, 농촌진흥청

• 고랭지배추 생육지표 분석결과, 전년과 비슷한 것으로 조사

- 준고랭지1기작 배추 생육은 정식 초기 저온 영향이 있었으나, 전반적으로 양호한 편이며, 출하는 평창(방림), 횡성지역 등에서 6월 하순부터 이루어질 예정
- 고랭지배추 초기 생육도 양호하며, 7월 중순까지 정식 진행

• 기상지표 분석결과, 주산지 강원지역 최근 기상여건 양호한 것으로 조사

- 최근 1개월 강수량이 평년보다 적었으나, 평균기온이 높고, 일조시간도 증가

<2020년 고랭지배추 생육 및 기상 지표>

구분		생육지표(6.8.~6.12.)	기상지표(5.16.~6.15.)
준고랭지1기작	4월 정식 (6~7월 출하)	전년과 비슷	평년보다 좋음
고랭지	5월 정식 (7~8월 출하)	전년과 비슷	

주: 생육 및 기상 지표는 전년 생육과 평년 기상의 분포를 파악하여, 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정하였음.
자료: KREI 농업관측본부 산지기동팀, 모형연구팀

※ 노지봄배추 산지 동향

• 노지봄배추 6월 출하분 작황 평년 수준, 7월 상순 출하 마무리

- 노지봄배추 6월 주 출하지역인 경북 문경·영양, 강원 영월 작황은 4월 저온 이후 기상여건이 양호하여 평년 수준으로 파악
- 6월 상순 고온 및 잦은 비로 석회결핍 피해 일부 발생
- 노지봄배추 출하는 7월 상순까지 이루어지겠으며, 저장작업 병행 예정

※ 고랭지배추·무 생육 실측 조사 개요

• 고랭지배추·무 주산지역 표본농가 중 배추 130개, 무 60개 필지를 선정하여 각 필지 내 표본구 3개(각 1평)의 생육 실측

- 조사항목: 초장(cm), 엽폭(cm), 엽수(매), 구폭(cm), 구고(cm), 근장(cm), 중량(g) 등
- 조사항목은 실측 시기(정식 이후 20일, 40일, 60일 경과)에 따라 상이

<초장(cm)>



<엽폭(cm)>



• 생육 실측 조사는 표본농가 필지를 대상으로 6~10월 총 9회에 걸쳐 실시하고, 실측 결과는 속보와 월보 등을 이용하여 정보 제공

- 수확 5~7일 전 단위당 수확량을 측정하여 생산량 실측 조사 실시

<2020년 생육 실측 조사 일정>

6월		7월		8월		9월		10월
1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차

자료: 농업관측본부 산지기동팀