

2024년 주요 채소류 생육 실측 3차 결과



여름배추

■ 7월 하순 ~ 8월 상순 여름배추 생육지표 전년 대비 낮음

- 5월 정식 여름배추 생육 부진
 - 정식 60일 경과 기준: 구고 19.2cm(전년 대비 0.2cm↑), 구중 1.9kg(0.7kg↓)
 - 뿌리혹병, 석회결핍 등 발생하였고, 7월 긴 장마로 일조시간 부족하여 생육 전년 대비 부진
 - 7월 하순 출하분 일부 과습 및 무름병 발생
- 8월 중·하순 출하 여름배추(6월 정식) 생육지표 전년 대비 낮음
 - 정식 20일 경과 기준: 초장 14.2cm(2.0cm↓), 엽수 12.6매(2.4매↓)
 - 일조시간 부족으로 생육 지연되었고, 무름병 및 석회결핍 등 발생하여 지난 조사(7.12) 대비 부진

| 여름배추 생육지표 |

구분	5월 정식	6월 정식
	3차(정식+60일)	1차(정식+20일)
생육지표(전년 대비)	낮음	낮음

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
24년	5월 정식	3차(정식 +60일)	32.3	23.3	75.4	25.0	19.2	1,886.4
	6월 정식	1차(정식 +20일)	14.2	10.3	12.6			
23년	5월 정식	3차(정식 +60일)	34.8	24.3	75.8	25.7	19.0	2,586.3
	6월 정식	1차(정식 +20일)	16.2	11.4	15.0			

주: 24년은 6월 13일 ~ 7월 19일 평균이며, 23년은 6월 21일 ~ 7월 20일 평균치
자료: KREI 농업관측센터



여름무

7월 하순~8월 상순 출하 여름무 생육지표 전년 수준

- 5월 파종 여름무 생육 전년과 비슷
 - 파종 70일 경과 기준: 근장 28.6cm(전년 대비 1.1cm↑), 근중 1.3kg(0.2kg↓)
 - 일조시간 감소로 생육 지연되었으나, 지난 조사(7.12) 대비 근중 증가하였고, 장마로 인한 침수 및 유실 피해 미미
- 6월 파종(8~9월 출하) 생육 전년과 비슷
 - 파종 30일 경과 기준: 초장 22.5cm(1.3cm↓), 엽수 12.6매(0.6매↓)
 - 초장 및 엽수 감소하였으나, 병해 발생 미미하여 작황 양호

여름무 생육지표

구분	5월 파종		6월 파종
	2차(파종+50일)	3차(파종+70일)	1차(파종+30일)
생육지표(전년 대비)	비슷	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

여름무 생육 실측 결과

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
24년	5월 파종	2차(파종 +50일)	35.8	24.2	26.3	690.2
		3차(파종 +70일)	40.2	37.1	28.6	1,319.5
	6월 파종	1차(파종 +30일)	22.5	12.6		
23년	5월 파종	2차(파종 +50일)	38.3	25.5	22.8	832.8
		3차(파종 +70일)	42.6	32.5	27.5	1,518.1
	6월 파종	1차(파종 +30일)	23.8	13.2		

주: 24년은 6월 19일~7월 18일 평균이며, 23년은 6월 26일~8월 1일 평균치
자료: KREI 농업관측센터

건고추

■ 건고추 3차 생육 실측 결과, 생육지표 전년과 비슷

- 충청·호남·영남지역 생육지표 전년과 비슷하거나 높음
- 충북: 분지수 9.9개(전년 대비 1.7개↓), 착과수 27.3개(2.7개↓)

- 전북: 분지수 11.0개(1.1개↑), 착과수 30.3개(3.7개↓)

- 경북: 분지수 9.0개(0.9개↓), 착과수 27.7개(0.7개↑)

- 장마로 인한 침수, 유실 등 피해 미미하였고, 병충해 발생 적어 생육 양호

- 향후 기상 여건에 따라 병충해 발생 및 확산 우려
- 강원·경기지역 생육지표 전년 대비 낮음
- 강원: 분지수 8.6개(2.0개↓), 착과수 19.5개(8.3개↓)

- 경기: 분지수 10.6개(0.8개↓), 착과수 23.5개(15.4개↓)

- 정식 지연, 저온, 일조시간 감소하여 강원·경기지역 생육지표 전년 대비 낮음

| 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	낮음	낮음	비슷	비슷	비슷	높음	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		착과수(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
강원	90.5	99.6	24.7	29.9	10.7	14.3	8.6	10.6	19.5	27.8
경기	96.2	103.2	30.7	24.6	13.9	16.0	10.6	11.4	23.5	38.9
충북	101.9	105.6	23.8	24.3	12.6	13.3	9.9	11.6	27.3	30.0
충남	103.1	101.0	28.5	27.2	15.5	14.2	10.4	10.3	22.1	34.5
전북	102.6	99.8	32.0	30.5	14.5	14.9	11.0	9.9	30.3	34.0
전남	108.2	96.0	30.8	26.7	16.2	14.1	11.2	10.1	34.9	27.0
경북	96.0	99.3	28.4	28.0	15.1	13.8	9.0	9.9	27.7	27.0
경남	110.2	100.5	25.3	31.9	13.5	15.5	13.0	10.3	32.1	32.5

주: 24년은 7월 10일~7월 22일 평균이며, 23년은 7월 11일~7월 20일 평균치
자료: KREI 농업관측센터