

2024년 주요 채소류 생육 실측 7차 결과

 여름배추 [8.26.~9.22.]

■ 10월 출하 여름배추 생육 전년 대비 낮음

- 8월 정식(10월 출하) 여름배추 생육지표 전년 대비 낮음
 - 생육기 고온 및 가뭄 영향으로 무름병, 석회결핍 및 결구 미숙 등 발생
 - 8월 정식(40일 경과) 기준: 초장 25.9cm(3.9cm↓), 엽폭 19.3cm(0.5cm↓)

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)	생육지표 (전년 대비)
24년	7월 정식	3차(정식 +60일)	35.1	21.4	60.0	15.1	27.1	1,183.2	낮음
	8월 정식	2차(정식 +40일)	25.9	19.3					낮음
23년	7월 정식	3차(정식 +60일)	35.6	22.4	65.5	17.5	25.6	1,475.7	
	8월 정식	2차(정식 +40일)	29.8	19.8					

주1) 24년은 8월 26일~9월 22일 평균이며, 23년은 8월 21일~9월 19일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

 가을배추 [9.9.~9.19.]

■ 가을배추 생육 전년 대비 낮음

- 가을배추 생육 전년 대비 낮음
 - 정식기 고온 및 가뭄으로 병충해 및 생리장해 발생
 - 향후 기상여건에 따라 생육회복 가능
 - 20일 경과 기준: 초장 21.9cm(2.0cm↓), 엽수 14.0매(4.2매↓)

| 가을배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(정식 +20일)	21.9	14.9	14.0	낮음
23년	1차(정식 +20일)	23.9	17.2	18.2	

주1) 24년은 9월 9일~9월 19일 평균이며, 23년은 9월 11일~10월 5일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



여름무 [9.11~9.23.]

10월 출하 여름무 생육지표 전년 대비 낮음

- 7월 파종(10월 출하) 여름무 생육지표 전년 대비 낮음
 - 생육기 고온 및 9월 잦은 비로 병해 및 생리장해 발생
 - 7월 파종(70일 경과) 기준: 엽수 31.6매(0.7매↓), 근중 1.0kg(0.2kg↓)

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)	생육지표 (전년 대비)
24년	7월 파종	3차(파종 +70일)	42.3	31.6	27.3	981.0	낮음
23년	7월 파종	3차(파종 +70일)	40.2	32.3	25.2	1,208.3	

주1) 24년은 9월 11일~9월 23일 평균이며, 23년은 9월 5일~9월 18일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



가을무 [9.11~9.12.]

가을무 생육지표 전년 대비 비슷

- 가을무 생육지표 전년 수준
 - 생육 초기 작황 부진했던 전년과 비슷하나, 고온 및 가뭄으로 결주 증가
 - 30일 경과 기준: 초장 27.8cm(1.9cm↑), 엽수 17.2매(3.5매↑)

| 가을무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	8월 파종	1차(파종 +30일)	27.8	17.2	비슷
23년	8월 파종	1차(파종 +30일)	25.9	13.7	

주1) 24년은 9월 11일~9월 12일 평균이며, 23년은 9월 13일~10월 19일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



건고추 [9.12.~9.17.]

■ 건고추 7차 생육 실측 결과, 생육지표 전년과 비슷

- 경기·충청·호남·영남지역 생육지표 전년과 비슷하거나 높음
 - 충북: 분지수 13.3개(전년 대비 1.4개↑), 수확과 5.1개(0.3개↑)
 - 전북: 분지수 17.3개(1.8개↑), 수확과 11.0개(5.5개↑)
 - 경북: 분지수 11.2개(1.1개↑), 수확과 7.6개(1.5개↑)
 - 9월 중·하순 수확과 전년 대비 증가하였으나 고온으로 상품성 저하 우려
- 강원지역 생육지표 전년 대비 낮음
 - 강원: 분지수 12.4개(0.2개↓), 수확과 11.1개(4.6개↑)
 - 초기 생육부진으로 인해 생육지표 전년 대비 낮음

| 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	낮음	비슷	비슷	비슷	높음	높음	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		수확과(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
강원	124.7	138.9	25.6	29.3	14.1	15.6	12.4	12.6	11.1	6.5
경기	125.7	122.9	30.4	25.7	13.7	12.9	12.2	14.3	15.5	7.4
충북	139.4	135.1	23.4	25.5	15.9	16.8	13.3	11.9	5.1	4.8
충남	129.2	121.7	26.5	25.5	16.8	16.7	11.5	12.9	7.0	3.7
전북	127.7	123.2	36.7	30.7	20.8	20.9	17.3	15.5	11.0	5.5
전남	132.3	115.6	35.3	30.1	19.3	17.0	15.6	12.4	17.0	5.1
경북	111.0	114.0	27.7	26.5	17.1	16.1	11.2	10.1	7.6	6.1
경남	113.1	109.7	21.1	22.3	15.8	16.5	15.4	13.8	13.7	10.5

주: 24년은 9월 12일~9월 17일 평균이며, 23년은 9월 14일~9월 21일 평균치
자료: KREI 농업관측센터