

2024년 주요 채소류 생육 실측 4차 결과



여름배추

■ 8월 하순~9월 상순 출하 여름배추 생육 전년 수준

- 추석 성수기 출하 여름배추 생육지표 전년 수준
 - 6월 정식(8월 상·중순 출하분) 잦은 비와 고온으로 생육 불균형, 병해, 바이러스 등 발생하여 생육 지표 전년 대비 낮음
 - 7월 정식분은 상대적으로 고지대 위치하여 고온 피해 적었으며, 생육 초기로 작황은 전년 수준
 - 6월 정식(40일 경과 기준): 초장 전년 대비 0.9cm↓, 엽폭 0.8cm↓
 - 7월 정식(20일 경과 기준): 초장, 엽폭 전년 수준, 엽수 3.5매↓

| 여름배추 생육지표 |

구분	6월 정식		7월 정식
	2차(정식+40일)	3차(정식+60일)	1차(정식+20일)
생육지표 (전년 대비)	비슷	낮음	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
24년	6월 정식	2차(정식 +40일)	27.4	18.6			
		3차(정식 +60일)	33.6	22.8	66.0	21.7	1,568.3
	7월 정식	1차(정식 +20일)	16.2	11.5	14.0		
23년	6월 정식	2차(정식 +40일)	28.3	19.4			
		3차(정식 +60일)	35.4	22.2	71.1	27.5	1,884.6
	7월 정식	1차(정식 +20일)	16.2	11.5	17.5		

주: 24년은 7월 10일~8월 1일 평균이며, 23년은 7월 12일~8월 23일 평균치
자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 8월 중순~9월 상순 출하 여름무 생육지표 전년 수준

■ 추석 성수기 출하 여름무 생육지표 전년 수준

- 8월 상순 출하 여름무 고온 및 일조량 부족으로 생육 지연되었으나 병해가 적어 생육 전년 수준
- 8월 중순~9월 상순 출하 여름무(6월 파종) 고온 및 돌풍 등으로 생육 지연 및 불균형 등 발생되었으나 초기 작황 전년 수준
- 6월 정식(파종 30일 경과 기준): 초장 0.8cm↓, 엽수 0.6매↑
- 6월 정식(파종 50일 경과 기준): 근장 전년 대비 0.1cm↑, 근중 0.4g↓

| 여름무 생육지표 |

구분	6월 파종	
	1차(파종+30일)	2차(파종+50일)
생육지표(전년 대비)	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
24년	6월 파종	1차(파종+30일)	23.0	13.8		
		2차(파종+50일)	33.9	25.5	18.8	417.9
23년	6월 파종	1차(파종+30일)	23.8	13.2		
		2차(파종+50일)	32.7	25.2	18.7	418.3

주: 24년은 7월 4일~30일 평균이며, 23년은 7월 5일~8월 16일 평균치
자료: KREI 농업관측센터



건고추

■ 건고추 4차 생육 실측 결과, 생육지표 전년과 비슷

- 경기·충청·호남·영남지역 생육지표 전년과 비슷하거나 높음
 - 충북: 분지수 13.0개(전년 대비 2.4개↑), 숙과수 15.2개(5.8개↑)
 - 전북: 분지수 13.4개(2.9개↑), 숙과수 14.7개(4.1개↑)
 - 경북: 분지수 10.6개(0.3개↓), 숙과수 8.9개(2.6개↑)
 - 건고추 작황 대체로 양호하나, 장마 이후 고온다습한 기상 여건에 따라 역병 등 발생 추세
- 강원지역 생육지표 전년 대비 낮음
 - 강원: 분지수 10.9개(1.5개↓), 숙과수 3.6개(2.1개↓)
 - 정식시기 저온 피해와 7월 잦은 강우 및 고온 영향으로 생육지표 전년 대비 낮음

| 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	낮음	비슷	비슷	비슷	높음	높음	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		숙과수(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
강원	103.9	113.3	25.3	29.5	12.0	14.8	10.9	12.4	3.6	5.7
경기	106.2	101.2	31.1	23.9	14.8	14.9	12.3	13.3	18.9	14.8
충북	117.1	111.7	22.9	22.7	13.0	14.2	13.0	10.6	15.2	9.4
충남	114.5	107.3	29.5	27.7	16.4	14.6	11.9	12.0	8.8	11.9
전북	114.8	103.6	32.4	29.3	15.3	14.9	13.4	10.5	14.7	10.6
전남	114.8	103.9	31.4	27.1	16.8	14.6	13.0	10.1	14.6	13.9
경북	104.5	103.5	29.1	27.9	16.0	14.1	10.6	10.9	8.9	6.3
경남	118.2	105.2	25.3	27.6	14.5	15.7	14.8	11.6	10.0	7.5

주: 24년은 7월 30일~8월 6일 평균이며, 23년은 7월 31일~8월 8일 평균치
자료: KREI 농업관측센터