

2024년 주요 채소류 생육 실측 5차 결과



여름배추

■ 9월 상·중순 출하 여름배추 생육 전년 수준

■ 7월 정식(9월 상·중순 출하) 여름배추 생육지표 전년 수준

- 9월 상·중순 출하 여름배추는 일부 병해 및 생리장해 발생하였으나 생육 전년 수준
- 6월 정식(60일 경과) 기준: 구폭 24.8cm(전년 대비 2.7cm↓), 구중 1.4kg(0.5kg↓)
- 7월 정식(40일 경과) 기준: 초장 28.3cm(1.4cm↓), 엽폭 20.1cm(0.3cm↑)

■ 9월 하순 이후 출하 여름배추 생육지표 전년 수준

- 현재 생육 초기 단계로 생육지표 전년 수준
- 7월 정식(20일 경과) 기준: 초장 17.1cm(0.9cm↑), 엽수 14.4매(3.1매↓)

| 여름배추 생육지표 |

구분	6월 정식	7월 정식	
	3차(정식+60일)	1차(정식+20일)	2차(정식+40일)
생육지표 (전년 대비)	낮음	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.

자료: KREI 농업관측센터

| 여름배추 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구폭(cm)	구고(cm)	구중(g)
24년	6월 정식	3차(정식 +60일)	32.9	20.8	70.2	24.8	16.8	1,400.0
		7월 정식						
	7월 정식	1차(정식 +20일)	17.1	12.1	14.4			
23년	6월 정식	2차(정식 +40일)	28.3	20.1				
		7월 정식						
	7월 정식	1차(정식 +20일)	35.4	22.2	71.1	27.5	18.0	1,884.6
23년	6월 정식	2차(정식 +40일)	16.2	11.5	17.5			
		7월 정식						
	7월 정식	2차(정식 +40일)	29.7	19.8				

주: 24년은 7월 23일~8월 17일 평균이며, 23년은 7월 18일~9월 6일 평균치

자료: KREI 농업관측센터



여름무

■ 9월 상·중순 출하 여름무 생육지표 전년 대비 낮음

■ 6월 파종(9월 상·중순 출하) 여름무 생육지표 전년 대비 낮음

- 9월 상·중순 출하 여름무는 고온 및 가뭄으로 생육 지연 및 생육 불균형 발생하여 근중 전년 대비 감소
- 6월 파종(50일 경과) 기준: 근장 18.0cm(전년 대비 0.7cm↓), 근중 0.3kg(0.1kg↓)
- 6월 파종(70일 경과) 기준: 근장 24.2cm(전년 대비 0.2cm↓), 근중 0.8kg(0.5kg↓)

■ 9월 하순 이후 출하 여름무 생육지표 전년 수준

- 고온으로 생육 지연 및 불균형 지속되고 있으나, 생육 초기 단계로 생육지표 전년 수준
- 7월 파종(30일 경과) 기준: 초장 24.4cm(0.8cm↑), 엽수 15.4매(1.2매↑)

| 여름무 생육지표 |

구분	6월 파종		7월 파종
	2차(파종+50일)	3차(파종+70일)	1차(파종+30일)
생육지표(전년 대비)	낮음	낮음	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.

자료: KREI 농업관측센터

| 여름무 생육 실측 결과 |

구분			초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)
24년	6월 파종	2차(파종 +50일)	32.2	25.1	18.0	320.6
		3차(파종 +70일)	37.2	31.8	24.2	833.2
	7월 파종	1차(파종 +30일)	24.4	15.4		
23년	6월 파종	2차(파종 +50일)	32.7	25.2	18.7	418.3
		3차(파종 +70일)	37.7	32.2	24.4	1,331.7
	7월 파종	1차(파종 +30일)	23.6	14.2		

주: 24년은 7월 23일~8월 18일 평균이며, 23년은 7월 25일~8월 30일 평균치

자료: KREI 농업관측센터



건고추

■ 건고추 5차 생육 실측 결과, 생육지표 전년과 비슷

- 경기·충청·호남·영남지역 생육지표 전년과 비슷하거나 높음
 - 충북: 분지수 14.9개(전년 대비 2.4개↑), 수확과 11.1개(3.3개↑)
 - 전북: 분지수 14.7개(0.7개↑), 수확과 6.4개(3.4개↓)
 - 경북: 분지수 11.4개(0.5개↑), 수확과 13.7개(2.2개↑)
 - 생육 대체로 양호하나, 8월 고온 및 가뭄 영향으로 후기 수확량 변동 가능
- 강원지역 생육지표 전년 대비 낮음
 - 강원: 분지수 12.5개(1.5개↓), 수확과 13.3개(3.2개↑)
 - 탄저병 등 병해 피해 적으나, 생육기 기상여건 부진으로 전년 대비 지표 낮음

| 건고추 생육지표 |

구분	강원	경기	충북	충남	전북	전남	경북	경남
생육지표 (전년 대비)	낮음	비슷	비슷	비슷	높음	높음	비슷	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

| 건고추 생육 실측 결과 |

구분	초장(cm)		주경장(cm)		경경(mm)		분지수(개)		수확과(개)	
	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
강원	111.8	123.7	25.5	29.3	13.3	16.4	12.5	14.0	13.3	10.1
경기	117.3	111.9	31.7	24.8	15.4	16.0	14.3	14.2	10.8	14.6
충북	125.5	124.4	23.1	25.9	13.8	15.2	14.9	12.5	11.1	7.8
충남	122.2	109.5	29.7	25.1	17.0	15.1	13.0	13.3	8.7	10.0
전북	122.2	117.8	32.5	27.8	16.3	18.1	14.7	14.0	6.4	9.8
전남	120.7	114.4	31.7	25.3	17.6	15.8	14.5	11.0	9.9	6.9
경북	107.4	106.9	29.3	26.2	16.6	14.7	11.4	10.9	13.7	11.5
경남	123.6	102.5	25.3	23.7	15.5	16.9	15.8	13.0	9.2	10.3

주: 24년은 8월 12일~8월 20일 평균이며, 23년은 8월 14일~8월 22일 평균치
자료: KREI 농업관측센터