

## 2024년 주요 채소류 생육 실측 11차 결과



### 가을배추 10.21.~11.14.

#### ■ 가을배추 생육지표 전년 수준

- 최근 기상여건 양호하여 가을배추 생육 전년 수준으로 회복
  - 생육 초기 고온 및 가뭄으로 생육 지연되었으나, 적절한 기온 및 강수량으로 가을 배추 생육 전년과 비슷
  - 정식 70일 경과: 엽수 63.0매(전년 대비 9.0매↓), 구중 2.2kg(0.2kg↓)

#### | 가을배추 생육 실측 결과 |

| 구분              | 초장(cm) | 엽폭(cm) | 엽수(매) | 구고(cm) | 구폭(cm) | 구중(g)   | 생육지표<br>(전년 대비) |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|
| 24년 3차(정식 +70일) | 42.1   | 27.8   | 63.0  | 29.5   | 17.7   | 2,214.8 | 비슷              |
| 23년 3차(정식 +70일) | 39.3   | 26.1   | 72.0  | 27.0   | 19.1   | 2,391.3 |                 |

주1) 24년은 10월 21일~11월 14일 평균이며, 23년은 10월 11일~11월 21일 평균치  
 주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.  
 자료: KREI 농업관측센터



### 겨울배추 10.29.~11.14.

#### ■ 겨울배추 생육 전년 수준

- 최근 기상여건 양호하여 겨울배추 생육 전년 수준
  - 정식 60일 경과 기준: 초장 37.2cm(전년 수준), 엽폭 27.7cm(0.7cm↑)
  - 정식기 고온 및 가뭄으로 생육 지연되었으나, 현재 회복하여 생육지표 전년 수준

#### | 겨울배추 생육 실측 결과 |

| 구분              | 초장(cm) | 엽폭(cm) | 생육지표<br>(전년 대비) |
|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 24년 2차(정식 +60일) | 37.2   | 27.7   | 비슷              |
| 23년 2차(정식 +60일) | 37.2   | 27.0   |                 |

주1) 24년은 10월 29일~11월 14일 평균이며, 23년은 11월 6일~11월 28일 평균치  
 주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.  
 자료: KREI 농업관측센터



## 가을무 10.15.~11.14

### ■ 가을무 생육지표 전년 대비 낮음

- 생육 초기 기상여건 부진하여 가을무 생육 전년 대비 낮음
  - 파종 80일 경과 기준: 근장 19.7cm(전년 대비 1.1cm↓), 근중 0.9kg(0.3kg↓)
  - 생육 초기 고온, 가뭄으로 결주 및 생육 불균형, 생리장해 등 발생

#### | 가을무 생육 실측 결과 |

| 구분  |             | 초장(cm) | 엽수(매) | 근장(cm) | 근중(g)   | 생육지표<br>(전년 대비) |
|-----|-------------|--------|-------|--------|---------|-----------------|
| 24년 | 3차(파종 +80일) | 45.8   | 23.1  | 19.7   | 931.3   | 낮음              |
| 23년 | 3차(파종 +80일) | 42.3   | 24.1  | 20.8   | 1,267.8 |                 |

주1) 24년은 10월 15일~11월 14일 평균이며, 23년은 10월 12일~11월 20일 평균치  
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.  
자료: KREI 농업관측센터



## 겨울무 10.23.~11.14.

### ■ 겨울무 생육지표 전년 대비 낮음

- 생육 초기 고온 등으로 겨울무 생육 지연
  - 60일 경과 기준: 근장 17.2cm(2.0cm↓), 근중 0.4kg(0.2kg↓)
  - 9월 고온, 10월 강풍 영향 등으로 생육 부진, 생리장해 발생하여 겨울무 생육지표 낮으나, 향후 기상여건에 따라 회복 가능

#### | 겨울무 생육 실측 결과 |

| 구분  |             | 초장(cm) | 엽수(매) | 근장(cm) | 근중(g) | 생육지표<br>(전년 대비) |
|-----|-------------|--------|-------|--------|-------|-----------------|
| 24년 | 2차(파종 +60일) | 38.8   | 22.4  | 17.2   | 400.4 | 낮음              |
| 23년 | 2차(파종 +60일) | 38.7   | 24.6  | 19.2   | 558.2 |                 |

주1) 24년은 10월 23일~11월 14일 평균이며, 23년은 10월 17일~11월 28일 평균치  
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.  
자료: KREI 농업관측센터