



주요 채소류 생육 실측 결과


#마늘 #양파

마늘·양파 생육 전년 대비 좋음




전국 기상지표 분석결과(4.18.~4.25.), 평균 기온 평년 대비 상승


기온(평년대비)



강수량(평년대비)



일조시간(평년대비)



2023년 마늘·양파 생육 실측 6차 결과 (4.18.~25.)



마늘

■ 2023년산 마늘 6차 생육 실측 결과, 전년 대비 좋음

■ 마늘 생육 전년 대비 좋음

- 제주(남도종) 엽수 8.0매(전년 대비 0.6매 ↑), 초장 85.1cm(2.2cm ↑)
- 경남(대서종) 엽수 8.8매(전년 대비 0.6매 ↑), 초장 86.7cm(2.2cm ↑)

| 2023년산 마늘 생육지표 |

구분	생육지표 (4.18.~25.)	품종	엽수(매)	초장(cm)
경남	전년 대비 좋음	남도	0.4 ↓	6.4 ↑
		대서	0.6 ↑	2.2 ↑
경북	전년 대비 좋음	대서	0.1 ↑	3.2 ↑
		한지	0.4 ↑	5.4 ↓
전남	전년 대비 좋음	남도	0.5 ↑	1.3 ↑
		대서	0.1 ↓	13.2 ↑
전북	전년 대비 좋음	남도	0.3 ↑	1.8 ↓
		대서	0.6 ↑	6.7 ↑
충남	전년 대비 좋음	대서	0.8 ↑	8.5 ↑
충북	전년 대비 좋음	한지	0.0 ⇐	6.1 ↓
제주	전년 대비 좋음	남도	0.6 ↑	2.2 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

| 2023년산 마늘 실측 결과 |

구분		엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
		23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산
경남	남도	7.8	8.2	88.1	81.7	36.8	36.7	20.4	17.6	37.9	40.9	45.0	42.2
	대서	8.8	8.3	86.7	84.5	31.7	31.7	16.6	15.1	41.2	40.2	43.8	44.7
경북	대서	8.4	8.3	79.1	75.9	26.7	26.2	16.4	15.3	43.4	39.2	41.0	41.0
	한지	7.5	7.1	59.0	64.5	11.3	14.3	11.6	10.9	19.4	18.1	10.5	10.0
전남	남도	8.9	8.4	78.0	76.7	31.1	30.3	18.6	17.1	35.2	32.7	30.3	26.5
	대서	8.7	8.8	81.9	68.7	27.3	21.5	16.8	16.7	45.9	39.9	41.8	36.9
전북	남도	8.7	8.4	80.2	82.0	28.7	30.1	20.4	18.6	31.7	30.0	27.0	24.1
	대서	8.5	7.8	81.1	74.4	28.1	24.7	17.4	14.7	38.0	32.7	35.0	28.1
충남	대서	9.5	8.7	95.0	86.5	34.3	28.8	19.9	19.4	45.8	39.8	48.6	39.9
충북	한지	7.3	7.3	56.1	62.2	12.1	14.7	11.6	9.9	15.3	18.2	9.1	8.7
제주	남도	8.0	7.4	85.1	82.9	43.1	43.2	20.5	19.1	43.7	43.7	47.5	51.5

주: 2023년산은 4월 18일 ~ 25일 평균이며, 2022년산은 4월 21일 ~ 27일 평균치임.

자료: KREI 농업관측센터



양파

■ 2023년산 양파 6차 생육 실측 결과, 전년 대비 좋음

■ 양파 생육 전년 대비 좋음

- 전남(조생종) 엽수 8.5매(전년 대비 0.6매 ↑), 초장 63.9cm(0.7cm ↓)
- 경남(중만생종) 엽수 10.1매(전년 대비 0.8매 ↑), 초장 81.2cm(7.3cm ↑)

| 2023년산 양파 생육지표 |

구분	생육지표 (4.18.~25.)	품종	엽수(매)	초장(cm)
경남	전년 대비 좋음	중만생	0.8 ↑	7.3 ↑
경북	전년 대비 좋음	중만생	1.6 ↑	14.9 ↑
전남	전년 대비 좋음	조생	0.6 ↑	0.7 ↓
		중만생	0.9 ↑	10.6 ↑
전북	전년 대비 좋음	중만생	0.9 ↑	10.1 ↑
충남	전년 대비 좋음	중만생	1.9 ↑	14.1 ↑

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

| 2023년산 양파 실측 결과 |

구분		엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
		23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산
경남	중만생	10.1	9.3	81.2	73.9	14.0	13.2	18.5	17.3	41.3	46.3	61.0	77.2
경북	중만생	9.2	7.6	77.8	62.9	12.5	9.2	17.6	14.4	41.0	32.0	57.8	34.6
전남	조생	8.5	7.9	63.9	64.6	14.3	13.9	14.8	15.2	68.1	68.1	196.5	192.6
	중만생	8.6	7.7	75.2	64.6	12.7	11.8	19.3	16.7	41.4	40.2	66.3	59.6
전북	중만생	8.6	7.7	76.5	66.4	13.5	12.0	17.2	15.7	39.5	38.0	50.9	47.4
충남	중만생	9.6	7.7	77.2	63.1	14.0	9.1	19.5	18.3	46.2	36.5	66.4	42.3

주: 2023년산은 4월 18일~25일 평균이며, 2022년산은 4월 21일~27일 평균치임.

자료: KREI 농업관측센터



기상 자료 분석 결과

■ 기상청 자료(4.18. ~ 4.25.), 분석 결과 평년 대비 평균기온 높고, 강수량 적음

- 제주 평균기온 16.9℃(평년 대비 1.4℃ ↑), 강수량 9.8mm(평년 대비 26.7mm ↓)
- 경남 평균기온 16.5℃(평년 대비 2.0℃ ↑), 강수량 10.9mm(평년 대비 11.8mm ↓)
- 전남 평균기온 15.7℃(평년 대비 2.0℃ ↑), 강수량 3.3mm(평년 대비 23.1mm ↓)

| 도별 기상개황 |

구분	평균기온(℃)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2023년	평년	2023년	평년	2023년	평년
경남	16.5	14.5	4.1	7.3	10.9	22.7
경북	15.3	13.9	5.4	7.5	5.0	18.6
전남	15.7	13.7	4.6	7.3	3.3	26.4
전북	16.9	13.6	5.2	7.5	1.2	17.8
충남	16.3	12.7	5.2	7.5	0.5	17.9
충북	16.1	13.1	4.7	7.4	2.8	17.7
제주	16.9	15.5	4.6	6.8	9.8	36.5

자료: 기상청

| 주간예보 |

평균기온 낮음 비슷 높음 강수량 적음 비슷 많음

구분	5월 1주(5.1.~5.7.)	5월 2주(5.8.~5.14.)
평균기온	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 높을 확률 40%	10% 40% 50% 평년 대비 높을 확률 50%
강수량	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 많을 확률 40%	40% 40% 20% 평년과 비슷하거나 적을 확률 40%



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

2023년 7차
속보 예고

2023.05.12

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

- 속보 작성 : 산지조사팀(한봉희, 최용훈, 강전상, 김주현)
- 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 : 김창민, 백지애, 서진주, 서홍규, 손완주, 안선민, 원하연, 유현주, 이균지, 이상은, 임찬균, 정승관, 주찬기, 최미연, 홍순환
- 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업근·양념채소관측팀