

2024년 주요 채소류 생육 실측 10차 결과

 가을배추 10.21.~10.30.

■ 가을배추 생육지표 전년 대비 낮음

- 생육 초기 고온, 가뭄 영향으로 가을배추 전년 대비 생육 지연
 - 정식 70일 경과: 엽수 60.1매(전년 대비 11.9매↓), 구중 1.8kg(0.5kg↓)
 - 현재 출하분 구중 전년 대비 감소하였으나, 최근 기상여건 양호하여 생육 회복 중

| 가을배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	구고(cm)	구폭(cm)	구중(g)	생육지표 (전년 대비)
24년	3차(정식 +70일)	40.9	25.2	60.1	30.3	17.4	1,841.9	낮음
23년	3차(정식 +70일)	39.3	26.1	72.0	27.0	19.1	2,391.3	

주1) 24년은 10월 21일~30일 평균이며, 23년은 10월 11일~11월 21일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터

 겨울배추 9.30.~10.30.

■ 겨울배추 생육 전년 수준

- 최근 기상여건 양호하여 겨울배추 생육 전년 수준
 - 정식 60일 경과 기준: 초장 39.1cm(1.9cm↑), 엽폭 27.5cm(0.5cm↑)
 - 9월 고온으로 생육 지연되었으나, 최근 기상여건 양호하여 생육지표 전년과 비슷

| 겨울배추 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽폭(cm)	엽수(매)	생육지표 (전년 대비)
24년	1차(정식 +30일)	29.6	22.0	19.2	비슷
	2차(정식 +60일)	39.1	27.5		비슷
23년	1차(정식 +30일)	28.9	21.3	23.2	
	2차(정식 +60일)	37.2	27.0		

주1) 24년은 9월 30일~10월 30일 평균이며, 23년은 10월 4일~11월 28일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



가을무 10.14.~10.31

- 가을무 생육 전년 대비 낮으나, 최근 기상여건 양호하여 회복 중
- 생육 초기 기상여건 부진하여 생육지표 전년 대비 낮음
 - 파종 60일 경과 기준: 근장 15.7cm(전년 대비 1.9cm↓), 근중 0.5kg(0.2kg↓)
 - 9~10월 기상여건 나빠 가을무 생육 지연되었으나, 최근 기상여건 양호하여 생육 일부 회복 중(9차 조사 근중 0.3kg→10차 0.5kg)

| 가을무 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)	생육지표(전년 대비)
24년	2차(파종 +60일)	42.6	20.0	15.7	527.0	낮음
23년	2차(파종 +60일)	38.0	21.1	17.6	658.5	

주1) 24년은 10월 14일~10월 31일 평균이며, 23년은 10월 10일~11월 14일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터



겨울무 9.26.~10.30.

- 겨울무 생육지표 전년 수준
- 10월 기상여건 양호하여 겨울무 생육지표 전년 수준
 - 60일 경과 기준: 근장 18.0cm(1.2cm↓), 근중 0.4kg(0.2kg↓)
 - 9월 고온으로 생육 지연되어 근장 및 근중 전년 대비 감소하였으나, 생육 회복 중
 - 다만, 파종 30일 경과 기준(9월 하순~10월 상순) 겨울무는 10월 중·하순 발생한 강풍 영향으로(염분 등)로 생육지표 전년 대비 낮음

| 겨울무 생육 실측 결과 |

구분		초장(cm)	엽수(매)	근장(cm)	근중(g)	생육지표(전년 대비)
24년	1차(파종 +30일)	24.0	12.9			낮음
	2차(파종 +60일)	41.5	21.1	18.0	445.6	비슷
23년	1차(파종 +30일)	24.9	15.9			
	2차(파종 +60일)	38.7	24.6	19.2	558.2	

주1) 24년은 9월 26일~10월 30일 평균이며, 23년은 9월 18일~11월 28일 평균치
주2) 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 낮음, 비슷, 높음으로 지표화하여 산정함.
자료: KREI 농업관측센터