



주요 채소류 생육 실측 결과


#마늘 #양파

8차 실측 결과, 마늘·양파 생육은 저온(4월 하순), 집중호우(5월 상순)로 7차 대비 부진
그러나, 작황이 나빴던 전년 대비 좋은 것으로 조사




전국 기상지표 분석결과(5.1~5.16), 기온 높고, 강수량 증가


기온(평년대비)



강수량(평년대비)



일조시간(평년대비)



2023년 마늘·양파 생육 실측 8차 결과 (5.10.~17.)



마늘

■ 마늘 8차 생육 실측 결과, 전년 대비 좋으나, 7차 조사 대비 부진

■ 제주지역 마늘 생육 전년 수준

- 제주(남도종) 구직경 52.6mm(전년 대비 1.8mm ↑), 구중 49.5g(1.8g ↓)
- 제주 마늘 생육 전년 수준이나, 저온(4월 하순), 집중호우(5월 상순) 이후 병해(잎마름병 등) 확산되어 생육지표 7차(4.27~5.9) 조사 대비 부진

■ 영남, 호남, 충청지역 전년 대비 좋음

- 경남(대서종) 구직경 61.8mm(전년 대비 2.2mm ↑), 구중 94.0g(5.7g ↑)
- 전남(남도종) 구직경 47.6mm(전년 대비 0.4mm ↑), 구중 52.7g(5.4g ↑)
- 제주지역 대비 병해 피해 크지 않고, 작황 부진했던 전년 대비 생육 양호

| 2023년산 마늘 생육지표 |

구분	경남	경북	전남	전북	충남	충북	제주
생육지표 (전년 대비)	좋음	좋음	좋음	좋음	좋음	좋음	비슷

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

| 2023년산 마늘 실측 결과 |

구분		엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
		23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산
경남	남도	5.2	5.0	66.8	62.0	36.9	36.2	16.0	11.5	51.3	51.4	62.1	58.5
	대서	7.5	7.0	79.8	74.3	37.0	35.6	15.1	12.8	61.8	59.6	94.0	88.3
경북	대서	6.7	7.6	83.1	81.2	37.8	35.6	15.7	14.5	56.6	55.5	75.5	71.6
	한지	7.1	6.8	85.4	75.4	24.0	23.3	13.7	11.8	33.1	33.6	26.1	24.6
전남	남도	6.7	6.7	62.2	58.5	33.6	30.7	14.4	13.4	47.6	47.2	52.7	50.2
	대서	6.4	7.1	62.8	55.9	32.8	25.3	12.3	11.7	56.2	55.5	83.7	78.3
전북	남도	7.4	7.2	79.9	78.6	41.9	39.1	17.4	15.9	57.5	50.0	71.9	55.6
	대서	7.4	6.0	71.1	70.2	31.7	30.6	13.8	12.1	63.8	56.0	93.0	69.8
충남	대서	6.9	7.2	76.7	73.7	38.3	33.0	16.7	16.4	61.3	58.0	93.8	78.1
충북	한지	7.1	6.7	73.9	71.5	21.9	21.4	12.5	10.8	30.3	31.5	22.9	20.4
제주	남도	3.7	4.7	45.1	50.7	33.2	33.4	12.7	13.3	52.6	50.8	47.7	49.5

주: 2023년산은 5월 10~17일 평균이며, 2022년산은 5월 11~18일 평균치임.

자료: KREI 농업관측센터



양파

■ 양파 8차 생육 실측 결과, 전년 대비 좋으나, 7차 조사 대비 부진

■ 전남지역 양파 생육은 작황 부진했던 전년과 비슷, 지난 조사 대비 부진

- 전남 구직경 65.8mm(전년 대비 0.7mm ↓), 구중 181.1g(0.2g ↓)
- 저온(4월 하순), 집중호우(5월 상순) 이후 중만생종 양파 병해(잎마름병, 노균병 등) 확산되어 생육지표 7차(4.27~5.9) 조사 대비 부진, 전년과는 비슷

■ 경남, 경북, 전북, 충남지역 전년 대비 좋음

- 경남 엽초장 구직경 62.5mm(전년 대비 1.3mm ↑), 구중 143.2g(1.1g ↑)
- 경북 엽초장 구직경 58.8mm(전년 대비 1.5mm ↑), 구중 128.5g(1.4g ↑)
- 전남지역에 비해 병해 피해 크지 않고, 작황 부진했던 전년 대비 생육 양호

| 2023년산 양파(중만생종) 생육지표 |

구분	경남	경북	전남	전북	충남
생육지표 (전년 대비)	좋음	좋음	비슷	좋음	좋음

주: 생육지표는 전년 생육의 분포를 토대로 매우 나쁨, 나쁨, 비슷, 좋음, 매우 좋음으로 지표화하여 산정

자료: KREI 농업관측센터

| 2023년산 양파(중만생종) 실측 결과 |

구분	엽수(매)		초장(cm)		엽초장(cm)		엽초경(mm)		구직경(mm)		구중(g)	
	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산	23년산	22년산
경남	9.8	8.6	94.8	77.0	19.4	15.3	22.5	17.2	62.5	61.2	143.2	142.1
경북	7.7	7.6	76.6	68.2	15.4	12.9	17.8	13.9	58.8	57.3	128.5	127.1
전남	8.5	7.8	70.4	69.5	16.2	16.0	20.3	16.8	65.8	66.5	181.1	181.3
전북	8.8	7.5	75.9	73.5	17.1	15.9	18.1	15.1	60.6	57.2	156.8	143.1
충남	8.4	8.0	69.1	66.8	14.3	12.5	17.7	17.8	65.4	60.7	169.1	150.1

주: 2023년산은 5월 10~17일 평균이며, 2022년산은 5월 11~18일 평균치임.

자료: KREI 농업관측센터



기상 자료 분석 결과

■ 기상청 자료(5.1. ~ 5.16.), 분석 결과 평년 대비 평균기온 높고, 강수량 많음.

- 제주 평균기온 17.7℃(평년과 비슷), 강수량 290.8mm(평년 대비 207.4mm ↑)
- 경남 평균기온 17.2℃(평년과 비슷), 강수량 153.9mm(평년 대비 98.3mm ↑)
- 전남 평균기온 16.3℃(평년과 비슷), 강수량 162.0mm(평년 대비 99.1mm ↑)

| 도별 기상개황 |

구분	평균기온(℃)		일조시간(hr)		강수량(mm)	
	2023년	평년	2023년	평년	2023년	평년
경남	17.2	17.2	6.8	7.2	153.9	55.6
경북	16.8	16.6	8.0	7.5	67.2	44.9
전남	16.3	16.3	6.7	7.1	162.0	62.9
전북	17.6	16.6	8.1	7.4	116.2	52.9
충남	16.6	15.7	8.1	7.7	78.7	55.6
충북	16.7	16.2	8.6	7.5	88.9	53.5
제주	17.7	17.7	6.4	6.6	290.8	83.4

자료: 기상청

| 주간예보 |

평균기온 낮음 비슷 높음 강수량 적음 비슷 많음

구분	6월 1주(5.29.~6.4.)	6월 2주(6.5.~6.11.)
평균기온	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 높을 확률 40%	30% 50% 20% 평년과 비슷할 확률 50%
강수량	20% 40% 40% 평년과 비슷하거나 많을 확률 40%	40% 40% 20% 평년과 비슷하거나 적을 확률 40%



월보 및 속보 관련 정보를 **핸드폰 문자(SMS)**로 받고자 하시는 분들은 농업관측센터 홈페이지(<http://aglook.krei.re.kr>) 또는 담당자(061-820-2285)에게 연락바랍니다.

2023년 9차 속보 예고

2023.06.01.

인터넷 홈페이지 : www.krei.re.kr | TEL : 043)238-3515 | FAX : 043)238-3533

- 속보 작성 : 산지조사팀(한봉희, 최용훈, 강전상, 김주현)
- 생육 실측조사 및 동향정보 수집 원예조사원 : 김창민, 박혜원, 백지애, 서진주, 서홍규, 손완주, 안선민, 안정민, 원하연, 유현주, 이균지, 이상은, 임찬균, 정승관, 주찬기, 최미연, 홍순환
- 감수 : 농업관측센터장 정민국, 원예실장 김원태, 업근·양념채소관측팀